Guide de management

Pour petits élevages de volailles traditionnelles

HENDRIX GENETICS

Guide d'élevage pour volailles traditionnelles SASSO

Pour éleveurs en zone rurale/fermiers

L'objectif principal du programme de sélection de SASSO pour l'éleveur de parentaux est d'avoir une production élevée d'œufs à couver (OAC> 220) et des poulets à croissance lente, robustes, faciles à gérer, qui peuvent être élevés dans différents systèmes d'élevage : sur sol en intensif, en plein air et en élevage familial. L'alimentation est en moindre quantité, moins coûteuse, moins riche en énergie et en protéines, et permet l'utilisation d'une plus grande diversité de sous produits.

Dû à la croissance plus lente des animaux, la viande SASSO est plus ferme, plus goûteuse et savoureuse comme peut l'être la viande de « poulet de village » et elle offre un prix de marché plus élevé. SASSO permet donc un meilleur profit pour l'éleveur et un meilleur goût pour le consommateur.

SASSO a une génétique de renommée internationale, originaire de France. SASSO fournit aux éleveurs des animaux robustes, faciles à gérer et efficaces.

Les éleveurs peuvent les garder dans plusieurs systèmes de production : depuis une production intensive jusqu'à un élevage plus traditionnel adapté à tout type de climat !

L'éleveur est la CLÉ et joue un rôle majeur dans la réussite de l'élevage

Chers éleveurs, lorsque vous envisagez d'élever des poussins, il est très important de réaliser que le poussin dépend totalement de vous pour subvenir à ses besoins. Les poussins ont besoin de soins, d'une température contrôlée, d'un environnement confortable, de nourriture, d'eau et de protection appropriée pour leur survie.

Les conseils fournis ici dans ce guide de l'éleveur sont essentiels à l'expression du potentiel génétique de SASSO pour obtenir de bons résultats. Suivez ces directives de base, restez simple et obtenez de bons résultats même avec des ressources limitées.

Technique d'élevage pour le « double usage »

- Biosecurité
- Préparation avant arrivage des poussins
- Livraison et réception des poussins
- Acclimatation des poussins pour un bon démarrage
- Gérer la croissance
- Vaccination
- Besoins en nutriment

Programme de biosécurité

La pratique de "la marche en avant" est préférable. Limitez les visiteurs, avoir un pédiluve et un lavabo à disposition à l'entrée est idéal.

N'autorisez pas les oiseaux sauvages et les animaux comme les chats et les chiens dans votre ferme. **Assurez une biosécurité stricte en cas d'apparition de maladies et de mortalité élevée des volailles dans les environs.**

Avant l'arrivée des poussins

Organiser les installations/matériels requis pour l'élevage de poulets de chair. **La gestion du pre-démarrage** consiste à **nettoyer et à désinfecter** le bâtiment avant l'arrivée de nouveaux lots de poussins.

Il faut enlever/racler l'ancienne litière, nettoyer le bâtiment - intérieur et extérieur, le laver, le désinfecter et le laisser reposer pendant une semaine.

Principe de base : " Nettoyez la zone de démarrage et préparez-la "

Les premières heures après l'arrivée à la ferme constituent la période la plus cruciale pour le poussin. **Le préchauffage** de la zone de démarrage **au moins 12 heures avant** l'arrivée des poussins offre des conditions confortables aux poussins à leur arrivée. Ils commencent bientôt à boire et à se nourrir. Leur réchauffement avec chaleur artificielle doit être assuré pendant les 2 à 3 premières semaines car les poussins ont besoin de chaleur externe pour maintenir leur température corporelle. Les poussins souffrent de stress lorsque la température de la zone de démarrage est trop froide ou trop chaude. Les poussins dans un environnement froid ont toujours un mauvais développement des organes digestifs et de l'immunité, qui sont à l'origine de futures maladies.

Pour rappel – un bon démarrage est clé pour la réussite

Objectif du démarrage

1. Déchargement rapide des poussins et les placer dans la zone de démarrage.
2. Zone de démarrage confortable – litière, température, lumière, ventilation, approvisionnement en eau et alimentation rapide. L'atteinte de ces objectifs dépend des installations et équipements de l'éleveur. **Ce dernier a un rôle très important à jouer durant cette phase**, la plus sensible de la vie de l'animal.

Atteindre ces objectifs est important pour un bon démarrage :

- Bonne croissance au démarrage – concerne la croissance du squelette et des organes internes
- Bonne croissance des plumes, uniformité, vivacité
- Immunité aux maladies et résistance au stress
- Bonne température et bonne répartition du petit matériel d'élevage (abreuvoir et mangeoire)

Un élevage inadéquat peut entraîner une mauvaise viabilité, une hétérogénéité, un coût de production plus élevé, un faible taux de rendement global et une mauvaise performance générale du lot.

Source de chaleur - Un chauffage (électrique/gaz/charbon) pour 500 à 600 poussins, suspendu à un endroit approprié.

Guide d'élevage pour volailles traditionnelles

• **Litière :** Étalez la litière sur le sol sur toute la zone de démarrage. Maintenez la litière en état sec, en enlevant la litière humide chaque fois que vous le remarquez.
• **Utiliser du papier démarrage** pendant les 2, 3 premiers jours est un plus indéniable. Prévoyez une protection circulaire de 2,5 m de diamètre pour 600 poussins. Du papier ondulé ou des feuilles de tôle de 30 cm de large peuvent être utilisées à cet effet.
• **Fournir de l'eau fraîche.** Ajouter des électrolytes 1g/ eau lit et sucre 50g/litre d'eau pour fournir de l'énergie instantanée. L'utilisation de pastèque aide dans le cas de déshydratation liée au transport.
• **Alimentation :** Une fois que les poussins ont bu de l'eau, donnez un aliment de démarrage frais et bien équilibré, facile à digérer, sur les plateaux ou assiettes pour poussins pendant les 3 premiers jours, puis dans des mangeoires linéaires ou tubulaires. Pendant les deux premiers jours, donnez de la poudre de maïs 5g/poussin avec l'aliment. **Cela réduit le problème d'entérite.**

• **Test du jabot :** Il s'agit d'un test simple sur le bien-être des poussins. Prenez un échantillon de quelques poussins 3 heures après leur arrivée. 98% des poussins doivent avoir un jabot plein et souple et des pattes chaudes, si ce n'est pas le cas, quelque chose ne va pas - observez les poussins et revérifiez la température, l'alimentation et l'eau. Prenez immédiatement les mesures correctives nécessaires pour éviter que les poussins ne meurent de faim et que leur croissance ne soit satisfaisante, ce qui entraînerait des inégalités dans le troupeau.
• **Ventilation :** La zone de démarrage doit être ventilée. Prévoyez une ouverture de 30 cm au-dessus des rideaux des deux côtés. La ventilation transversale fournit de l'air frais et régule la température de la zone. Il élimine le CO_2, l'ammoniac, l'humidité, la poussière et les odeurs indésirables.
• **Lumière :** Les poussins sont plus actifs et grandissent mieux sous une lumière vive. Prévoyez une ampoule de 60 watts pour une surface de 16 m². Après 2 semaines, elle peut être remplacée par une ampoule de 40 watts. Le programme d'éclairage suggéré est un programme "dégressif".

PROGRAMME LUMINEUX

Âge en jour	1 à 2	3 à 7	8 à 14	Après 14
Heure de lumière	24	20	16	Lumière naturelle

Température de démarrage et équipements adéquats



Confortable | Trop froid | Courant d'air | Trop chaud

Des poussins répartis de façon homogène dans la zone de démarrage montre de bonnes conditions de ce dernier. Eau et aliment dans les bons dosages.

Zone de confort pour les poussins : vos propres observations seront le meilleur indicateur. Les poussins confortables sont répartis uniformément dans la zone. Les poussins froids se blottissent sous la source de chaleur. Les poussins qui ont trop chaud s'en éloigneront. Les poussins qui se trouvent dans une zone exposée aux courants d'air se blottissent loin de la source de ces courants. **Prenez les mesures correctives nécessaires en fonction de ces observations.**

Le bon équilibre entre température, lumière et ventilation fournira aux poussins un environnement approprié pour un apport suffisant en eau et en nourriture. C'est la clé d'un **« bon départ »** !

Les éléments à surveiller durant les premières heures :

• Observer les poussins, leur comportement et leur répartition. Les poussins doivent être actifs et se reposer. Ils doivent consommer de l'eau, se nourrir et interagir les uns avec les autres. Il est important que les poussins puissent être bien répartis à l'intérieur de la zone démarrage.
• Renouveler l'aliment et remplir les abreuvoirs avec de l'eau douce régulièrement.

Travail à faire les premiers jours :

• Visitez le bâtiment 5 à 6 fois par jour.
• Vérifiez que les oiseaux soient à l'aise.
• Enlever les poussins morts, malades et faibles.
• Nettoyez et répartissez la litière en marchant doucement à travers les poussins.
• Nettoyez les abreuvoirs et remplissez-les d'eau fraîche deux fois par jour.
• Nettoyez les mangeoires et remplissez-les d'aliment frais deux fois par jour.
• Vérifiez la température, la ventilation et la lumière du bâtiment.

PÉRIODE DE DÉMARRAGE



Comment aider les poussins pendant la première semaine à optimiser leur démarrage ?
• Protégez le troupeau des attaques des prédateurs et des voleurs.
• Surveillez votre troupeau quotidiennement et soyez à la recherche de signes, ou de comportement inhabituel. L'incapacité de manger, de boire ou de réagir normalement sont des indicateurs d'un problème. Un diagnostic et un traitement rapides peuvent ainsi sauver votre troupeau d'une mortalité.
• Si la mortalité survient, obtenez le diagnostic d'un laboratoire dès que possible. Donnez des médicaments et des traitements seulement après avoir reçu ce diagnostic.

GÉRER LA CROISSANCE

• À partir de la 2ème semaine, commencez à donner plus d'espace au sol, plus de mangeoires et d'abreuvoirs. Si vous avez un endroit clos et sûr où les poussins peuvent être relâchés pendant la journée, vous pouvez permettre aux oiseaux d'accéder à l'aire libre après l'âge de 3 semaines. Cependant, il est nécessaire de distribuer environ 80% de l'aliment à l'intérieur du bâtiment le matin et le soir. Les oiseaux pourront trouver la nourriture restante à l'extérieur.
• Ne poussez pas les oiseaux à prendre du poids rapidement avec des aliments trop protéiques. Élevez les oiseaux à 8 à 10 semaines pour développer le bon goût, la texture et la saveur.
• Evaluer le poids vif des poussins (5 % du cheptel) à intervalle hebdomadaire afin de s'assurer que la croissance est à la hauteur des recommandations. Suivez les programmes de vaccination appropriés à vos régions et les protocoles médicamenteux si besoin.

Guide d'élevage pour le "double usage" SASSO

EXEMPLE DE PROGRAMME DE VACCINATION

Veuillez noter que ce programme de vaccination est une recommandation « standard » et que vous DEVEZ demander à votre vétérinaire un programme de vaccination dédié en fonction de votre région !

• Tenir un registre de la consommation d'aliment pour suivre le taux de conversion alimentaire (FCR), la mortalité, les médicaments et la vaccination.

Chaque lot de sujet nous communique des informations utiles pour les prochains. Les registres de la consommation d'aliment, de la mortalité, des médicaments utilisés, du poids vif vendu et des revenus provenant de la vente doivent ainsi être conservés. Cela aidera à calculer le coût de production de chaque lot et à trouver des moyens de les réduire et d'améliorer la rentabilité des lots à venir.

Âge en semaine	Vaccination
1	New castle
2	New castle
3	
4	Gumboro
5	
6	Variole
7	
8	New castle

NUTRITION SASSO

Veuillez consulter votre nutritionniste pour connaître la formule alimentaire en fonction des besoins nutritionnels. Des matières premières disponibles localement provenant de sources végétales pourraient être utilisées. L'utilisation d'huile, de viande, de poisson et d'autres matériaux coûteux peut ainsi être évitée. Un exemple de formule d'alimentation est fourni ici à titre de référence. Les prémélanges contenant des acides aminés, des vitamines, des oligo-éléments disponibles localement pourraient être utilisés pour simplifier la formulation de l'aliment.

Utilisez des anticoccidiens, des enzymes (avec phytase), des probiotiques, des oligo-éléments chélatés et des liants de toxines au niveau de dosage recommandé.

Utilisez des probiotiques et évitez les antibiotiques. Prévenir la croissance de moisissures sur les matières premières et les aliments. Pendant les mois d'été, utilisez de la soude Bi-carb (1kg / tonne) et vitamine C (50 g / tonne) pour réduire le stress estival. Conservez correctement les aliments pour éviter la menace des rats. Distribuer de l'aliment frais 2 à 3 quotidiennement en petites quantités.

Faites analyser occasionnellement les aliments par un laboratoire local. Après l'âge de 3 semaines, les oiseaux peuvent être laissés en liberté où ils trouveront de la nourriture. Pendant cette période, 80 % des besoins totaux en nourriture doivent être distribués le matin et le soir à l'intérieur du bâtiment et les sujets peuvent trouver les 20 % de nourriture restants dans le parcours libre. L'eau doit être fournie dans une zone ombragée en plein air.

L'élevage en plein air favorise le bon développement musculaire et la fermeté de la viande. Les animaux peuvent être autorisés à se développer lentement jusqu'à 9 à 10 semaines pour obtenir la fermeté, la texture, le goût et la saveur souhaités de la viande. Les volailles peuvent être vendues en fonction des exigences particulières de poids vif du client (environ 1,5 kg pour obtenir un bon rendement d'écharnage et de transformation).

Route de Solférino
40630 Sabres - FRANCE
T +33 5 58 04 46 46
sasso@hendrix-genetics.com

sasso-poultry.com